



2026



**DESCARGA
EL CATÁLOGO**
ESCANEA EL QR



SOLUCIONES ESENCIALES PARA EL FUTURO DE LA AGRICULTURA



ÍNDICE

INSECTICIDAS	4
FUNGICIDAS	11
HERBICIDAS	17
BIOESTIMULANTES	22
CORRECTORES NUTRICIONALES	23
INDUCTORES DE RESISTENCIA	25
REGULADORES DE CRECIMIENTO	26
COADYUVANTES Y ACIDIFICANTES	27



INSECTICIDAS

ALTRIA®

Cyflumetofen 200 g/L



Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Grupo químico: Derivado de Betacitonitrilo
Presentaciones: 1L, 250ml

Insecticida/acaricida que actúa rápidamente por contacto e ingestión. Posee alta selectividad y eficacia contra los diferentes estados de desarrollo de los ácaros (huevos, ninfas, adultos).

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Palto	Araña marrón	<i>Oligonychus punicea</i>	0.10*	45	0.01
Mandarino	Araña roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	0.10 - 0.125	7	0.3
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.30	1	0.6

ALUD®

Imidacloprid 350 g/L



Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Grupo químico: Neonicotinoides
Presentaciones: 1L, 250ml, 20L

Insecticida sistémico del grupo de los Neonicotinoides de amplio espectro de control sobre insectos picadores-chupadores y queresas. Así mismo presenta un buen efecto sobre Prodiplosis en diversos cultivos.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	%		
Espárrago	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.2 - 0.25	-	14	0.05
Pimiento			-	0.10 - 0.125	7	1.0
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.15 - 0.20	-	14	1.0
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.10 - 0.20	-	21	1.0
Mandarino	Minador de hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.15 - 0.20	-	30	1
Arándano	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.20 - 0.25	-	1	5

BLASTEK®

Profenofos 500 g/L



Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Grupo químico: Organophosphate
Presentaciones: 1L, 20L

Está formulado por el ingrediente activo: Profenofos, que es un insecticida no sistémico, de acción estomacal y por contacto, con efecto translaminar.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/200L	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Cebolla (Allium cepa)	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.375	14	0.02
Pimiento (Capsicum annum)	Gusano Cortador	<i>Agrotis ipsilon</i>	0.15	7	3

PQUA N° 4141

LANZAMIENTO 2026



INSECTICIDAS

CIPERSOL®

Cypermethrin 250 g/L



PQUA N° 525-SENASA

Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)

Grupo químico: Piretroides

Presentaciones: 1L

Insecticida del grupo de los Piretroides, actúa por contacto (rápidamente a través de la cutícula del insecto) y por ingestión sobre larvas y adultos (durante la aplicación y la ingestión de tejidos tratados). Actúa sobre el sistema nervioso central y periférico de los insectos ya que bloquea la transmisión de las señales nerviosas al impedir el cierre o prolongar la abertura de los canales de sodio.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L	ml/ha		
Tomate	Polilla del tomate	<i>Tuta absoluta</i>	200 - 250	400 - 500	7	0.5
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	300 - 400	-		0.01

CIRCUS®

Chlorfenapyr 240 g/L



PQUA N° 414-SENASA

Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Grupo químico: Pyrroles

Presentaciones: 1L, 250ml

Insecticida de amplio espectro, altamente efectivo, actúa por ingestión y contacto. Posee buen efecto translaminar y es un excelente larvicida.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/ha	L/200L		
Tomate	Polilla del tomate	<i>Tuta absoluta</i>	200	-	7	0.05
Mandarino	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	-	0.06 - 0.08	14	0.05
Arándano	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	-	0.15 - 0.25	15	0.01
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.15	22	0.01

CONVICTUS®

Imidacloprid 700 g/Kg



PQUA N° 1672-SENASA

Formulación: Gránulos dispersables (WG)

Grupo químico: Neonicotinoides

Presentaciones: 100g

Insecticida sistémico formulado como gránulos dispersables en agua, pertenece al grupo de los Neonicotinoides, tiene un amplio espectro de control sobre insectos picadores-chupadores y queresas. Así mismo presenta un buen efecto sobre Prodiplosis en diversos cultivos.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (Kg/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Pimiento	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.10 - 0.12	7	1.0
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.10 - 0.15	21	0.1



INSECTICIDAS



EVADE 20 SL®

Acetamiprid 200 g/L



Formulación: Concentrado Soluble (SL)

Grupo químico: Neonicotinoides

Presentaciones: 1L, 250ml

Evade 20 SL es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión y presenta movimiento sistémico y translaminar. Actúa sobre el sistema nervioso central del insecto, dando como resultado una sobreexcitación, parálisis y finalmente muerte de la plaga.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Mandarino	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.20 - 0.25	14	1
Arándano	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.10 - 0.15	1	2
	Cryptocephallus	<i>Cryptocephallus</i> sp.	0.15 - 0.25		
	Piojo blanco	<i>Pinnaspis aspidistrae</i>			
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.15 - 0.20	45	0.01
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.15 - 0.20	3	0.5

EXPLOIT®

Fipronil 200 g/L



Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Grupo químico: Phenylpyrazole

Presentaciones: 1L, 250ml

Es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual sobre coleópteros, larvas de lepidópteros y Prodiplosis en diversos cultivos.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L	%		
Col	Gusano de la col	<i>Plutella xylostella</i>	100 - 125	-	14	0.02
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	200 - 250	-		
Espárrago	Caracha	<i>Prodiplosis longifila</i>	225 - 250	-	21	0.005
Arroz	Mosquilla del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	-	0.15	46	0.01
Palma aceitera	Spaethiella	<i>Spaethiella tristis</i>	300	-	14	0.005
Arándano	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	200 - 300	-	3	0.005

GREENEX ULTRA®

Matrine 5 g/L



BIOLOGICO



Formulación: Concentrado Soluble (SL)

Presentaciones: 1L, 20L, 200L


Insecticida - acaricida orgánico de origen vegetal con una rápida acción de contacto sobre adultos y ninfas de ácaros y mosca blanca. Dada su condición de producto natural se puede utilizar en aplicaciones cercanas a la cosecha del cultivo.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (ml/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	300 - 400	N.A.	N.A.
Mandarino	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	200 - 300		
Palto	Arañita roja	<i>Oligonychus punicae</i>			
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	200 - 400		
	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	400 - 600		
Arándano	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	300 - 400		
	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>			
Banano	Trips del plátano	<i>Chaetanaphotrips signipennis</i>	200 - 600		
Pimiento	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	250 - 400		
Granado	Pulgón verde de los cítricos	<i>Aphis spiraecola</i>	200 - 300		

MÁXIMO CONTROL CON PODEROSO EFECTO RESIDUAL

FIPRONIL 20% SC

- ✓ Insecticida que actúa por contacto e ingestión.
- ✓ Excelente acción residual.
- ✓ Amplio espectro de control de plagas.
- ✓ Se aplica a suelo y follaje.



CONTROLA

GORGHOJO
DE LOS ANDES

PRODIPOSIS

MOSQUILLA
DEL ARROZ

GUSANO DE LA COL.



REG. PQUA N° 384 - SENASA



Genagro

CALIDAD Y EFICIENCIA AGRÍCOLA



INSECTICIDAS

LANZAMIENTO 2026

LENKA®

Chlorantraniliprole 200 g/L



Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Presentaciones: 1L, 250ml

Insecticida con un novedoso mecanismo de acción que actúa en los receptores de rianodina, llevando a un agotamiento en el almacenamiento interno del calcio, que deteriora la regulación de las contracciones musculares. Los insectos expuestos a Chlorantraniliprole, exhiben en general letargia y parálisis muscular seguido posteriormente por la muerte. También tiene actividad de contacto aunque es más eficaz a través de la ingestión del material tratado.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/Ha)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	0.15	1	0.01
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	0.15 - 0.20	3	1.5
Arroz	Barreno de la caña	<i>Diatrea saccharalis</i>	0.10	15	0.4
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>			

LANZAMIENTO 2026

MERCI®

Thiamethoxam 350 g/L + Fipronil 200 g/L



Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Grupo químico: Fipronil (Fenilpirazol), Thiamethoxam (Neonicotinoide)

Presentaciones: 1L, 250ml

Insecticida de contacto e ingestión, cuyos dos ingredientes activos, el thiamethoxam actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, causando un bloque irreversible de los receptores nicotinérgicos postsinápticos de la acetilcolina; el fipronil interfiere con el paso de los iones de cloruro a través de los canales de cloro regulados por el ácido-γ-aminobutírico (GABA).

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/ha)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.25	29	Thiamethoxam: 0.01 Fipronil: 0.01

PBUA N° 4010-SENASA

MORTERO®

Abamectina 20 g/L



Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)

Grupo químico: Avermectinas

Presentaciones: 1L, 250ml, 20L, 200L

Es un insecticida - acaricida que actúa por contacto e ingestión sobre arañas e insectos minadores de hojas. Presenta un buen efecto translaminar lo que provoca una buena residualidad del producto sobre las plagas.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200L		
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.4	0.2	14	0.01
Mandarina	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>		0.1 - 0.15	7	
	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>				
	Minador de cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>		0.10 - 0.12		
Quinua	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	-	0.2 - 0.25	N.D.	0.02
Alcachofa		<i>Nemomyza maculosa</i>		0.2 - 0.30	7	
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>		0.15 - 0.20	14	
Vid		<i>Tetranychus urticae</i>		0.15 - 0.25	28	
Arveja	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>		0.25	3	0.01
Arándano	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>		0.2 - 0.4	15	0.01

PQUA N° 714-SENASA



INSECTICIDAS



PANIC®

Alfa-cypermethrin 100 g/L



PQUA N° 558-SENASA

Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)

Grupo químico: Piretroides

Presentaciones: 1L, 250 ml

Insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e ingestión sobre larvas y adultos de lepidópteros.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L	L/ha		
Papa	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	250	0.625	15	0.05
Alcachofa	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	200 - 250	-	14	0.01

PHASMA®

Thiamethoxam 141 g/L + Lambdacyhalothrin 106 g/L



PQUA N° 1781-SENASA

Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Grupo químico: Neonicotinoides + Piretroides

Presentaciones: 1L, 250ml

Novedoso insecticida que actúa sobre el sistema nervioso del insecto. Actúa por contacto e ingestión y a través del Thiamethoxam presenta una alta actividad translinar y sistémica con movimiento acropétalo (ascendente) dentro de la planta. Lambdacyhalothrin tiene un buen efecto de choque y ejerce un efecto de repelencia sobre los adultos de los insectos.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Arroz	Mosca minadora	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.15 - 0.20	-	21	Thiamethoxam : 0.01 Lambda cyhalothrin: 1
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.20 - 0.25	-	7	Thiamethoxam : 0.01 Lambda cyhalothrin: 0.02
Cebolla			-	0.250 - 0.300	14	Thiamethoxam : 0.01 Lambda cyhalothrin: 0.2

PROGEN®

Spirotetramat 150.0 g/L



LANZAMIENTO 2026

PQUA N° 4271

Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Grupo químico: Tetramic acid

Presentaciones: 1L, 250 ml, 20L

Actúa básicamente por ingestión ya que el efecto por contacto es poco significativo. Una vez absorbido por la planta, el producto presenta doble sistemicidad ya que se mueve tanto por floema y xilema alcanzando a proteger los nuevos puntos de crecimiento en brotes y raíces.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L		
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.100 - 0.125	15	0.4
Pimiento	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.200 - 0.250	1	1



INSECTICIDAS



REDWOLF®

Emamectin benzoate 50 g/Kg + Lufenuron 100 g/Kg



PQUA N° 3712-SENASA

Formulación: Gránulo Dispersable (WG)
Grupo químico: Avermectin + Benzoilurea
Presentaciones: 1Kg, 100g

Insecticida que actúa principalmente por ingestión, formulado con dos ingredientes activos, que afectan de manera diferente al insecto: mediante la regulación de su crecimiento y alteración de su sistema nervioso, con lo cual se afecta la formación de quitina y se produce la parálisis del lufenuron la afectación es hacia los primeros estadios de desarrollo.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/Cil	Kg/ha		
VID	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	0.1	0.3	7	Lufenuron: 0.01 Emamectin benzoate: 0.03

SKIRLA ULTRA®

Emamectin benzoato 250.0 g/Kg



PQUA N° 1951 - SENASA

Formulación: Gránulo Dispersable (WG)
Grupo químico: Avermectina
Presentaciones: 1kg, 20g, 100g

Actúa principalmente por ingestión y tiene cierta acción por contacto. Presenta un movimiento translinar y provee actividad residual contra las larvas de lepidópteros que se alimentan de las hojas.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (Kg/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.020 - 0.025	3	0.02

SPIGOL®

Spinosad 120 g/L



PQUA N° 3965-SENASA

Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Grupo químico: Fermentación de la bacteria
Saccharopolyspora spinosa
Presentaciones: 1L, 20L

Insecticida con modo de acción por contacto e ingestión que actúa sobre los insectos principalmente lepidópteros. Por su mecanismo de acción actúa excitando el sistema nervioso de los insectos, provocando su desequilibrio y muerte.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Arándano	Gusano perforador	<i>Chloridea virescens</i>	0.075-0.10	-	3	1.5
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.1	14	2



FUNGICIDAS



ADENDA®

Difenoconazole 250 g/L



Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Grupo químico: Triazoles
Presentaciones: 1L, 250ml

Adenda es un fungicida sistémico y traslaminar con acción preventiva, curativa y erradicante, que interfiere en la síntesis del ergosterol, constituyente natural de la membrana celular del patógeno, inhibiendo el crecimiento del micelio y el desarrollo de los síntomas de la enfermedad.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.15-0.20	21	3
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	0.15-0.20	1	4
	Oidium	<i>Erysiphe elevata</i>	0.15-0.20	1	4
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.25 - 0.30	30	0.03
Mango	Oidiois	<i>Oidium mangiferae</i>	0.15 - 0.20	7	0.07
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.1 - 0.15	15	0.6

AMIZELL®

Azoxystrobin 200 g/L + Cyproconazole 120 g/L



Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
Presentaciones: 1L, 250ml

Fungicida protectante, erradicante y antiesporulante indicado para el control de hongos. Inhibe la respiración mitocondrial y la biosíntesis del ergosterol que detiene el crecimiento del micelio del hongo, así como la producción y germinación de las esporas.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/ha)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5	30	Azoxystrobin: 0.01 Cyproconazole: 0.1

AZOSTAR®

Azoxystrobin 500 g/Kg



Formulación: Gránulos dispersables (WG)
Grupo químico: Estrobilurinas
Presentaciones: 1Kg, 100g

Es un fungicida del grupo químico de las estrobilurinas de amplio espectro, sistémico y traslaminar, con propiedades preventivas y curativas (en estados iniciales de infección). Además presenta un buen efecto antiesporulante. Azostar favorece una mejor asimilación de nitrógeno en la planta aumentando la capacidad fotosintética y retardando la senescencia del cultivo.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(Kg/ha)	(g/200L)		
Pimiento, pprika y aj	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.20 - 0.24	80	3	2
Vid		<i>Erysiphe necator</i>	0.2	40	14	
Cebolla	Mancha prpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.25 - 0.30	100	2	10
Alcachofa	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.20 - 0.24	80	7	5
Esprrago	Mancha prpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.25	80 a 100	N.D.	0.05
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.40 - 0.50	40 a 50	0	15
Arndano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	0.30	-	4	5

PODEROSA ACCIÓN DE GRAN CONTROL

DIFENOCONAZOLE 25% EC

CONTROLA

- ✓ OIDIUM
- ✓ MUERTE REGRESIVA
- ✓ ALTERNARIA
- ✓ STEMPHYLIUM

**RÁPIDA
ACCIÓN**
dentro de la
planta.

**NO ESTRESA
EL CULTIVO.**

- Fungicida sistémico y translaminar con acción protectora, curativa y erradicante.
- Amplio espectro de acción, mayor efecto de choque y residualidad.





FUNGICIDAS



LANZAMIENTO 2026

BLONDIE®

Fluopyram 200 g/L + Tebuconazole 200 g/L



Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Grupo químico: Fluopyram (Pyridylethylamidas) + Tebuconazole (Triazoles)
Presentaciones: 1L, 20L, 250 ml

Fungicida sistémico compuesto por Fluopyram que actúa como un inhibidor de la succinato deshidrogenasa (SDHI) de la cadena respiratoria mitocondrial y Tebuconazole que inhibe la biosíntesis del ergosterol, e interrumpe el crecimiento y reproducción de los hongos Grupo FRAC N°7 (Fluopyram) y Grupo FRAC N°3 (tebuconazole).

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/ha)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Uva	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.5	21	Fluopyram: 2.0 Tebuconazole: 6.0

BULLMAX®

Azoxystrobin 200 g/L + Difenconazole 125 g/L



Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Grupo químico: Estrobilurinas/Triazol
Presentaciones: 1L, 20L, 250 ml

Fungicida formulado a base de los ingredientes activos azoxystrobin y difenoconazole de acción preventiva, curativa y erradicante. Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y alcanza los tejidos vasculares. Se distribuye homogéneamente por todos los tejidos sin acumularse en los bordes de las hojas.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Espárrago	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	0.2	0.583	100	0.01
Arándano	Blueberry leaf rust	<i>Thekopsora minima</i>	0.15-0.2	-	1	Azoxystrobin: 5 Difenconazole: 0.1

CROPLAN®

Carbendazim 500 g/L



Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Grupo químico: Benzimidazoles
Presentaciones: 1L

Fungicida de actividad de contacto y sistémico. Croplan es fácilmente absorbido por hojas y se mueve dentro de la planta en forma ascendente. Presenta propiedades protectoras y curativas sobre el hongo.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (ml/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Mandarina	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 250	7	0.7
Vid			400 - 500		3

CYFLUNIL®

Cyprodinil 375 g/Kg + Fludioxonil 250 g/Kg



Formulación: Gránulos dispersables (WG)
Grupo químico: Lanolinopirimidinas + Fenilpirroles
Presentaciones: 1Kg, 100g, 25Kg

Moderno fungicida compuesto por dos ingredientes activos que se complementan para otorgar un rápido y prolongado control sobre Botritis en diferentes cultivos. Cyflunil actúa por contacto y también ingresa al tejido foliar por lo que puede controlar infecciones ya presentes en la planta y ejerce una acción simultánea sobre esporas y micelio del hongo.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200L		
Fresa	Podredumbre gris/Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0 - 1.2	-	1	Cyprodinil: 5 Fludioxonil: 3
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.80 - 1.00		7	Cyprodinil: 3 Fludioxonil: 2
Arándano			0.6 - 0.8	0.2 - 0.26	0	Cyprodinil: 8 Fludioxonil: 4
Palto	Muerte Regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.75 - 1.0	0.15 - 0.20	0	Cyprodinil: 1 Fludioxonil: 0.4



FUNGICIDAS



ENDURA®

Pyraclostrobin 133 g/L + Epoxiconazole 50 g/L

PQUA Nº 1060-SENASA



Formulación: Suspoemulsión (SE)
Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
Presentaciones: 1L, 250ml

Fungicida sistémico con propiedades preventivas, curativas, erradicativas y con un buen efecto antiesporulante sobre diversas enfermedades. Endura presenta un doble mecanismo de acción ya que inhibe la respiración celular de los hongos y la síntesis de ergosterol a nivel de la membrana celular.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200L		
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.75	-	40	Pyraclostrobin: 0.02 Epoxiconazole: 0.05
Cebolla			0.5			Pyraclostrobin: 1.5 Epoxiconazole: 0.05
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	0.250 - 0.350	45	Pyraclostrobin: 0.3 Epoxiconazole: 0.05
Maíz	Mancha negra del maíz	<i>Phyllachora maydis</i>	0.5 - 0.6	0.20 - 0.24	60	Pyraclostrobin: 0.02 Epoxiconazole: 0.1

FOBOS®

Iprodione 500 g/kg

PQUA Nº 522-SENASA



Formulación: Polvo Mojable (WP)
Grupo químico: Dicarboximida
Presentaciones: 1Kg

Fungicida de contacto y con capacidad de ingresar al tejido foliar pero sin presentar un movimiento sistémico. Sobre el hongo impide la germinación de las esporas, inhibe el crecimiento del micelio y la producción de órganos reproductores de esporas.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	14	10
Palto	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	14	0.02
Alcachofa	Podredumbre/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	14	0.02
Mandarina	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300 - 400	30	1
Cebolla	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	500 - 600	7	0.2

FUNGIRAZ®

Prochloraz 450 g/L

PQUA Nº 3045-SENASA



Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Grupo químico: Imidazole
Presentaciones: 1L, 250ml

Fungicida de amplio espectro con propiedades curativas y preventivas que actúa por contacto (no sistémico) y translaminar.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.2 - 0.3	14	5



FUNGICIDAS



KOROSU®

Propineb 700 g/Kg + Cymoxanil 60 g/Kg

PQUA N° 3964-SENASA



Formulación: Polvo Mojable (WP)

Grupo químico: Acetamida y ditiocarbamato

Presentaciones: 1Kg

Fungicida que combina la acción del propineb con el cymoxanil, por lo cual se logra la inhibición de la respiración celular del patógeno, la inhibición de la síntesis de ADN, ARN y aminoácidos, así como la alteración del metabolismo celular fúngico lo que conlleva a su muerte.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil 200 L	Kg/ha		
Papa	Hielo fungoso, racha o seca seca	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5	1.0	14	0.1

RELIKIA®

Thiabendazole 500 g/L

PQUA N° 2593-SENASA



Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Grupo químico: Benzimidazole

Presentaciones: 1L, 250ml, 20L, 200L

Fungicida sistémico, con acción protectora y curativa que actúa interrumpiendo la división celular del hongo e inhibiendo el crecimiento micelial.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(L/200L)	L/ha (Max)		
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	0.15 - 0.20	1	15	5
	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	2.0 - 3.0*		
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.15 - 0.20	0.75 - 1.0	15	10
Arándano			0.20 - 0.25	-	45	0.01
Vid			0.15-0.20	-	76	0.05

*Vía sistema de riego

RAMADAN®

Propineb 700 g/kg

LANZAMIENTO 2026



PQUA N° 4286-SENASA

Formulación: Polvo Mojable (WP)

Grupo químico: Ditiocarbamatos

Presentaciones: 1Kg

Tiene como ingrediente activo al propineb, que actúa por contacto, con acción preventiva y largo poder residual sobre las plantas. Esta acción se puede dar en una serie de procesos metabólicos diversos y sitios en las células de los patógenos, por ello se considera como un fungicida multisitio.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(Kg/200L)	Kg/ha		
Cebolla	Mancha púrpura	<i>Stemphylium versicarium</i>	0.5	1.0	10	0.05



FUNGICIDAS



RUDO®

Cymoxanil 80 g/Kg + Mancozeb 640 g/Kg

PQUA N° 630-SENASA



Formulación: Polvo Mojable (WP)

Grupo químico: Cianoacetamida-oxima + Ditiocarbamatos

Presentaciones: 1Kg

Fungicida compuesto por dos ingredientes activos con propiedades preventivas y curativas sobre la racha y mildiu en papa, cebolla y vid. Presenta un rápido efecto de control cuando la enfermedad se encuentra en el campo.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200L		
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	2.0	-	7	Mancozeb: 1.5 Cymoxanil: 0.05
Papa	Racha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5 - 2.0		14	Mancozeb: 0.2 Cymoxanil: 0.05
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	-	0.5 - 0.75	14	Mancozeb: 1.5 Cymoxanil: 0.2
Quinoa		<i>Peronospora farinosa f.sp. chenopodii</i>		0.50 - 1.00	25	0.05

SENTAI®

Azoxystrobin 250 g/Kg + Tebuconazole 500 g/Kg

PQUA N° 371-SENASA



Formulación: Gránulos Dispersables (WG)

Grupo químico: Estrobilurina + Triazol

Presentaciones: 1Kg, 100g

SENTAI es un fungicida sistémico con acción preventiva y protectora cuyos ingredientes activos tienen mecanismos de acción complementaria, el azoxystrobin inhibe la germinación de las esporas y crecimiento micelial mientras que el tebuconazole inhibe la síntesis de ergosterol esencial para la formación de las membranas celulares del hongo, lo que conlleva a su muerte.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/cil		
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.3	-	40	Azoxystrobin: 0.04 Tebuconazole: 0.05
Café	Roya Amarilla	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	0.2	30	Azoxystrobin: 0.03 Tebuconazole: 0.15
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.25	-	14	Azoxystrobin: 3 Tebuconazole: 0.5

TEBUFORT®

Tebuconazole 250 g/l

PQUA N° 410-SENASA



Formulación: Emulsión de aceite en agua (EW)

Grupo químico: Triazoles

Presentaciones: 1L, 250ml

Fungicida sistémico del grupo de los triazoles de efecto curativo y erradicante ya que ingresa rápidamente en el tejido vegetal afectando el desarrollo del hongo antes de que se observen síntomas de la enfermedad y cuando éstos sean ya visibles en el cultivo.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	mL/200L		
Capsicum annum	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.60 - 0.75	200 - 250	14	0.5
Espárrago	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.60	300	21	0.05
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>		-		
Mango	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	0.30	50	14	0.1
Vid		<i>Erysiphe necator</i>	-	60 - 80	21	2



HERBICIDAS

BARRACUDA®

Atrazina 200 g/L + Nicosulfuron 30 g/L



Formulación: Suspensión Miscible en Aceite (OF)
Grupo químico: Triazinas + Sulfonilúreas
Presentaciones: 1L

Herbicida sistémico post emergente que puede ser absorbido por hojas y brotes. De movimiento acropétalo (ascendente) y basipétalo (descendente) dentro de la planta (por efecto del nicosulfuron). Presenta efecto pre emergente a través de la atrazina ya que es absorbida por las raíces y se mueve hacia los puntos de crecimiento vía xilema dentro de la maleza.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Maíz	Hierba de Gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>	0.8 - 1.2	Atrazina: 45 Nicosulfuron: 90	Atrazina: 0.1 Nicosulfuron: 0.01
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Grana dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			
	Grana china	<i>Sorghum halepense</i>			

* Aplicación dirigida después de la apertura de filocladios.

CLEUS®

Clethodim 240 g/L



Formulación: Concentrado emulsionable (EC)
Grupo químico: Ciclohexanedione
Presentaciones: 1L, 500ml

Herbicida sistémico selectivo de aplicación post-emergente ecaz para el control de malezas gramíneas. Se absorbe rápidamente por el follaje y se trasloca a la raíz y partes en crecimiento de las malezas.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Cebolla	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.3 - 0.4	45	0.5
	Grana china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Grana dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			
Papa	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.4 - 0.5	30	
	Grana dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			

EXTREMIST®

Cyhalofop butyl 210 g/L + Penoxsulam 30 g/L



Formulación: Dispersión Oleosa (OD)
Grupo químico: Aryloxyphenoxypropionate y Triazopyrimidine
Presentaciones: 1L

Herbicida sistémico postemergente empleado para el control de malezas ciperáceas, gramíneas y de hoja ancha. EXTREMIST posee 2 mecanismos de acción: inhibe la síntesis de aminoácidos esenciales y también de ácidos grasos en malezas. Es absorbido por las hojas y se trasloca hacia otros órganos de la planta por el xilema y el floema deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza y provocando su muerte. EXTREMIST se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen deseado, agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/ha)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	1 - 1.25	30	Cyhalofop butyl: 0.02 Penoxsulam: 0.01
	Pata de Gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			



HERBICIDAS

GANGSTER®

Atrazine 500g/L



Formulación: Concentrado Soluble (SL)
Grupo químico: Triazinas
Presentaciones: 1L

Herbicida selectivo, pre y post emergente, de acción sistémica. El producto es absorbido principalmente por las raíces y también penetra a través de las hojas traslocándose por el interior de las plantas, esto trae como consecuencia la muerte de la maleza.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200L		
Maíz	Yuyo Amor Seco Cadillo Chamico Verdolaga Capulí cimarrón Pata de gallina Lechera	<i>Amaranthus hybridus</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Euphorbia hypericifolia</i>	1.5	0.750	7	0.1

GARROTE®

Glufosinate ammonium 200 g/L



Formulación: Concentrado Soluble (SL)
Grupo químico: Ácido fosfínico
Presentaciones: 1L

Herbicida de contacto, no selectivo post-emergente, que actúa inhibiendo la enzima glutamina sintetasa, produciendo una alteración del metabolismo del amonio, causando la acumulación fitotóxica dentro de la maleza, y ejerciendo su efecto herbicida.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Maíz	Yuyo Hierba del gallinazo Chamico Verdolaga Gramma dulce Coquito Pata de gallina Gramma china	<i>Amaranthus hybridus</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Sorghum halepense</i>	0.75 - 1.25	-	70	0.1
Palto	Yuyo Amor seco Coquito Verdolaga	<i>Amaranthus viridis</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Portulaca oleracea</i>	-	1-2	15	
Vid	Amor seco Verdolaga	<i>Bidens pilosa</i> <i>Portulaca oleracea</i>	1-1.5	2-3	21	0.15

HARVADE®

2,4-D 720g/L



Formulación: Concentrado Soluble (SL)
Grupo químico: Clorophenoalquilo
Presentaciones: 1L

Herbicida hormonal, sistémico, selectivo y post-emergente que controla malezas anuales y perennes de hoja ancha en los cultivos de gramíneas y pastos.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	mL/200L		
Maíz	Yuyo Amor Seco Chamico Verdolaga Hierba mora Chapatolla	<i>Amaranthus hybridus</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Echinochloa colonum</i>	1.2 - 1.5	600-750	7	0.05

GRAN PODER DE CONTROL CONTRA LAS MALEZAS

GLIFOSATO

88%
SG



HERBICIDA
SISTÉMICO

REG. PQUA N° 1733 - SENASA



MEJOR ABSORCIÓN POR HOJAS Y
VELOZ ACCIÓN HACIA TALLOS Y RAÍCES.

Controla : gramíneas ciperáceas hoja ancha



Genagro

CALIDAD Y EFICIENCIA AGRÍCOLA



HERBICIDAS



LANZAMIENTO 2026

LYNCE®

Linuron 500 g/Kg



Formulación: Polvo Mojable (WP)

Grupo químico: Fenilurea

Presentaciones: 1Kg (10 bolsitas de 100 gr)

Herbicida sistémico post emergente, selectivo usado para controlar malezas de hoja ancha y angosta. LYNCE es un inhibidor de la fotosíntesis mediante inhibición del fotosistema II.

PQUA N° 3998-SENASA

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS Kg/ha	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium album</i>	0,75	1	0,05
Vid	Rabo de zorro	<i>Setaria parviflora</i>	2,5	28	0,05
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			

OCTANO®

Glyphosate 880 g/Kg



Formulación: Gránulos solubles (SG)

Grupo químico: Fosfonoglicinas

Presentaciones: 1Kg

Herbicida post emergente no selectivo con la más alta concentración de glifosato en el mercado. Actúa rápidamente sobre hojas anchas, gramíneas anuales / perennes y ciperáceas. Posee un excelente movimiento sistémico hacia los órganos de reserva (rizomas y coquitos) logrando controlar eficientemente las malezas.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (Kg/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Mandarino	Pega Pega Capulí cimarrón Chamico Coquito Grama china Hierba de gallinazo Yuyo Verdolaga	<i>Setaria verticillata</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Portulaca oleracea</i>	0.8 - 1.0	1	0.5
Espárrago	Capulí cimarrón Chamico Coquito Grama china Verdolaga Yuyo	<i>Nicandra physalodes</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus spinosus</i>		5	0.1
Palto	Amor seco Capulí cimarrón Hierba del gallinazo Verdolaga	<i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Portulaca oleracea</i>		1	0.2
Vid	Amor seco Capulí cimarrón Hierba del gallinazo Lechera Pega pega	<i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Euphorbia hirta</i> <i>Setaria verticillata</i>		14	0.5

PQUA N° 1733-SENASA



HERBICIDAS

SATHO®

Glyphosate en forma de sal isopropilamina 480 g/L

PQUA N° 3448-SENASA



Formulación: Concentrado Soluble (SL)
Grupo químico: Phosphonoglycine
Presentaciones: 1L, 20L

Herbicida sistémico, no selectivo post-emergente, que actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos necesarios para formar proteínas estructurales y metabolitos esenciales en el desarrollo de las malezas.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Mandarina	Coquito Gramma dulce Pata de gallina	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Eleusine indica</i>	3.0	N.A.	0.5

SENTENCIA®

Cyhalofop butyl 360.0 g/L

PQUA N° 2322-SENASA



Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Grupo químico: Aryloxyphenoxypropionic
Presentaciones: 1L

Herbicida post-emergente y sistémico que se utiliza para el control de malezas gramíneas en el cultivo de arroz. Presenta una rápida absorción foliar y se mueve a través del floema de manera moderada acumulándose en las regiones meristemáticas. Las malezas cesan su crecimiento inmediatamente después del tratamiento con manchas de color amarillo que aparecen entre los 2 a 3 días, ocasionando necrosis y muerte de toda la maleza dentro de 2 a 3 semanas. No tiene actividad en el suelo.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/200L)	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz	Cadillo Pajilla Gramma Moco de pavo Pata de gallina Paspalidium Gramma mazorquilla	<i>Cenchrus echinatus</i> L. <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Leptochloa uninervia</i> <i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Paspalidium geminatum</i> <i>Ischaemum rugosum</i>	0.5 - 0.7	45	0.4



BIOESTIMULANTES



TRILLIUM®

Concentrado del alga *Ascophyllum nodosum* 15%



Presentaciones: 1L, 20L, 200L

Bioestimulante vegetal proveniente del extracto del alga *Ascophyllum nodosum*, enriquecido con fitohormonas y factores de crecimiento, los cuales se utilizan para estimular la división celular en los órganos en desarrollo, activar las yemas vegetativas, uniformizar la floración y favorecer el cuajado y amarre de los frutos.

CULTIVO	DOSIS		OBSERVACIONES
	L/200L	L/ha	
Uva de mesa	0.5 - 1	4 - 5	Aplicar al inicio y a mediados del desarrollo del brote, a un 50% de floración, en el cuajado de los frutos y durante el desarrollo de la baya junto con el AG3.
Mandarina, Lima y Limón			Aplicar durante al inicio de botoneo, durante la plena floración y el llenado de frutos.
Palto			Aplicar durante la etapa de prefloración y amarre del fruto.
Arándano y Berries	0.5 - 1	2 - 3	Aplicar durante el brotamiento, floración y desarrollo de los frutos.
Cebolla			Aplicar a los 30 días después del trasplante y al inicio del pre-bulbeo.
Espárrago			Aplicar a mediados de la formación y desarrollo del primer brote. Luego aplicar cada 3 semanas.
Paprika y Ajiés			Aplicar a mediados del desarrollo vegetativo, luego en prefloración, cuajado y después de cada paña.



CORRECTORES NUTRICIONALES



LANZAMIENTO 2026

AGRILON FE® Hierro EDDHA 6 % (p/p) Fe



Presentaciones: 5 kg

Se puede aplicar tanto en fertirrigación, como en inyección, pulverización al suelo o aplicación al suelo en surcos o en la zona radicular enterrado a una profundidad de 10-20 cm. Es compatible con numerosos productos fitosanitarios, a excepción de aquellos fuertemente alcalinos, siendo preferible realizar una prueba previa a la aplicación.

CULTIVO	DOSIS (kg/ha)	FRECUENCIA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Uva de mesa, Uva vinífera	3 - 4	2 - 4 aplicaciones/campaña	Inicio de brotamiento
Palto, Cítricos, Mango	3 - 4	2 - 3 aplicaciones/campaña	Inicio de brotamiento y crecimiento de fruto
Arándano, Fresas	2 - 4	2 - 4 aplicaciones/campaña	Inicio de brotamiento
Hortalizas	2 - 4	2 - 3 aplicaciones/campaña	Inicio de brotamiento y crecimiento de fruto

FLORIPHOS® Fosforo 50% + Zinc 1.6%



Presentaciones: 1L

Es un fertilizante foliar líquido estable que contiene una alta concentración de fósforo soluble, enriquecido con Zinc, muy fácilmente absorbible y de buena adhesión a la mayoría de los tipos de tejidos vegetales.

CULTIVO	DOSIS		OBSERVACIONES
	L/200L	L/ha	
Mandarina, Lima, Limón, Palto y Mango	0.5 - 1	5 - 10	Aplicar durante la prefloración, floración e inicio de amarre de frutos.
Vid		3 - 6	Aplicar desde el desarrollo del brote hasta la floración.
Manzano y Durazno		3 - 5	Aplicar desde el hinchado de yemas, brotamiento, floración y cuajado de frutos.
Espárrago		1 - 3	Aplicar durante el almáximo, en el trasplante hasta la apertura de los filocladios.
Café y Cacao	1 - 2		Aplicar desde el brotamiento hasta el cuajado de los frutos.
Algodón y Maíz			Aplicar desde la emergencia hasta la etapa de prefloración.
Fresa y Arándanos	1	2 - 3	Aplicar desde el trasplante hasta el cuajado de los frutos.
Alverja, Holantao, Vainita, Frejol y Pallar			Aplicar desde el inicio de la floración hasta el cuajado de los frutos.
Ajo y Cebolla			Aplicar desde el trasplante hasta el inicio del bulbo.
Papa y Camote			Aplicar desde la emergencia hasta el desarrollo de los tubérculos.
Arroz			Aplicar después del trasplante, durante el macollamiento y punto de algodón.
Pimientos, Ajos y Tomate			Aplicar después del trasplante hasta el cuajado de los frutos.
Hortalizas de Hoja			Aplicar después del trasplante y durante el desarrollo vegetativo.
Brócoli y Coliflor			Aplicar después del trasplante hasta el inicio de la formación de la inflorescencia.
Zapallo, Sandía y Melón			Aplicar desde la emergencia de plantas, floración y cuajado.



CORRECTORES NUTRICIONALES



MONTAFOL CALCIO BORO®

14% Calcio + 0.8% Boro p/v



Presentaciones: 1L, 20L

Fertilizante foliar con una solución concentrada y soluble de Calcio y Boro acomplexado con ácidos orgánicos.

CULTIVO	DOSIS		OBSERVACIONES
	L/200L	L/ha	
Papa	0.5 - 1	1 - 2	La primera aplicación es a los 40 a 50 días de la siembra (antes del aporque) y la segunda aplicación a los 30 días después.
Leguminosas			Aplicar al inicio de la oración y el crecimiento de la vaina.
Tomate, Paprika y Ajíes			Aplicar al inicio de la oración y el cuajado de la fruta, para evitar la caída de flores y frutos.
Fresa			Aplicar al inicio de la oración y el cuajado de la fruta, para incrementar el número, color y tamaño de los frutos.
Cebolla y Ajo			Esencial en la división y crecimiento celular para incrementar peso y tamaño del bulbo.
Col, Coliflor, Lechuga			Una aplicación 20 días después del trasplante, para evitar el quemado por altas temperaturas.
Melón, Zapallo y Sandía			Aplicar en plena fructificación, para evitar el rajado de los frutos.
Ápico			Un aplicación a los 25 días del trasplante para evitar el corazón negro del apio.
Uva de Mesa	0.5	2 - 4	Aplicar al inicio de la floración y el cuajado de la fruta.
Mandarino, Lima, Limón, Palto y Mango			
Manzano y Durazno			



INDUCTORES DE RESISTENCIA



HIDROX Cu® Cobre (Cu) 50%



Presentaciones: 1Kg, 25Kg

Es un fertilizante foliar líquido estable que contiene una alta concentración de Cobre (estabilizado como Cu(OH)2).

CULTIVO	DOSIS		OBSERVACIONES
	Kg/200L	Kg/ha	
Mandarina, Lima y Limón	0.5	4 - 5	Aplicar después de la poda, durante la floración y durante el desarrollo del fruto.
Palto			Aplicar después de la poda, durante la pre-floración y antes de la cosecha.
Uva de mesa			Aplicar durante la post-cosecha o durante el brotamiento, después de la poda de formación.
Mango			Aplicar después de la poda, durante la pre-floración y antes de la cosecha.
Espárrago	0.5 - 0.75	1 - 3	Aplicar después de la apertura de los filocladados y durante el desarrollo del segundo brote.
Cebolla y ajo	0.5	-	Aplicar durante el desarrollo vegetativo, durante el pre-bulbeo y antes de la cosecha.
Fresa		0.5 - 1	Aplicar durante el desarrollo vegetativo.
Papa	0.5 - 1	0.5 - 2	Aplicar durante el desarrollo vegetativo y después del aporque.
Arroz			Aplicar a los 7 días después del trasplante, durante el macollamiento, punto de algodón y espigado.
Hortalizas de Hoja			Aplicar a los 7 días después del trasplante. Repetir de 2 a 3 veces durante el desarrollo vegetativo si fuese necesario.
Café		1 - 2	Aplicar durante el brotamiento y el desarrollo del fruto.

INDUCE® Fósforo 30% + Potasio 20%



Presentaciones: 1L, 20L, 200L

Fertilizante mineral que actúa como un activador de la resistencia vegetal, logrando que sus componentes activos ejerzan una acción sinérgica para la inducción y producción de ciertos mecanismos de defensa que permitan prevenir y amortiguar el daño ocasionado por las enfermedades en los cultivos.

CULTIVO	DOSIS		OBSERVACIONES
	L/200L	L/ha	
Papa	0.5 - 1	1 - 3	Aplicar al suelo "Drench" durante la siembra y/o 7 días después de la emergencia. Repetir cada 15 días si fuese necesario.
Cebolla, Ajo y Kión			Aplicar a los 7 días después del trasplante. Repetir a los 14 días si fuese necesario.
Hortalizas de Hoja			Aplicar después del trasplante. Repetir a los 7 días si fuese necesario.
Alverja Holantao, Frijol y Vainita			Aplicar a partir de los 10 días de la siembra hasta la floración y luego a la aparición de primeras vainas.
Pepinillo, Zapallo y Caigua.			Aplicar a los 10 días después de la emergencia. Repetir a los 15 días si fuese necesario.
Granadilla y Maracuyá			Aplicar al suelo "Drench" después del trasplante y repetir cada 30 días si fuese necesario.
Fresa, Berries y Piña			Aplicar después del trasplante. Repetir a los 7 o 15 días si fuese necesario.
Tomate, Pimiento y Ajíes		2.5 - 5	Aplicar al suelo "Drench" durante la siembra y/o a los 7 días después del trasplante. Repetir a los 15 o 30 días si fuese necesario.
Alcachofa			Aplicar después del trasplante. Repetir a los 7 o 15 días si fuese necesario.
Espárrago			Aplicar al suelo "Drench o goteo" antes y después del chapado. Repetir cada 30 días si fuese necesario.
Palto y Mango			Aplicar durante la prefloración y el inicio del brotamiento. Repetir la aplicación durante el crecimiento del fruto.
Uva de mesa y Vinífera			Aplicar en pleno brotamiento, en la formación del racimo y durante el envero.
Mandarina, Lima y Limón			Aplicar durante la prefloración y el inicio del brotamiento. Repetir la aplicación durante el crecimiento y la maduración del fruto.
Manzano y Melocotón			Aplicar en pleno brotamiento y después del cuajado.



REGULADORES DE CRECIMIENTO



PACZOL®

Paclobutrazol 250 g/L



Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Grupo químico: Triazoles

Presentaciones: 1L, 20L, 200L

Regulador de crecimiento sistémico cuyo modo de acción se traduce en la inhibición de la síntesis de giberelinas, lo que produce una disminución del crecimiento vegetal desviando los nutrientes asimilados (fotosintatos) hacia una mayor producción y crecimiento de frutos. Aumenta la cantidad de yemas florales e induce una proporción mayor de ramilletes florales en la parte inferior del árbol, incrementando la cantidad de frutos cuajados.

CULTIVO	USOS	DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
		%	L/ha		
Palto <i>Persea americana</i>	Controla el crecimiento vegetativo. Favorece el cuajado y crecimiento de frutos	0.6 - 1 % (2 aplicaciones de 0.3 - 0.5 %)	1.5 - 2.5	60	0.5

UNIKRON®

Uniconazole 50 g/L



Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Grupo químico: Triazole

Presentaciones: 1L, 20L, 200L

Es un regulador de crecimiento del grupo de los triazoles, que es absorbido por las raíces y tallos, con translocación en el xilema a los puntos de crecimiento de la planta. Actúa inhibiendo la biosíntesis de giberelinas disminuyendo el crecimiento vegetativo y la competencia entre brotes vegetativos y flores, favoreciendo de forma indirecta el desarrollo de los futuros frutos cuajados de palto.

CULTIVO	MODO DE ACCIÓN	DOSIS (L/ha)*			P.C. (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
		Total	Por Aplicación			
			1°	2°		
Palto	Evita la caída prematura de frutos durante el cuajado y maduración. Mejora el rendimiento y calidad del fruto.	6	En floración (50% de flores abiertas): 3	En frutos cuajados: 3	90	0.02

* En floración

LANZAMIENTO 2026

RCP N° 0152-SENASA

RCP N° 023-SENASA



COADYUVANTES Y ACIDIFICANTES



MI-PH®

Ácido Asimilable 30% + Surfactantes, diluyentes y acondicionadores 70%



Presentaciones: 1L, 20L

Coadyuvante diseñado para regular el pH del agua empleada en aplicaciones agrícolas. Su fórmula permite visualizar el pH del agua mediante cambios de color, lo que evita el uso de equipos de medición adicionales.

pH	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
Escala de colores									

PEGAMAX®

Polyalkylencoxide modificado Heptamethyltrisiloxane + Allyloxypolyethyleneglycol methyl ether 60% + Alcohol etoxilado 20%



Presentaciones: 1L, 20L, 200L

Coadyuvante ampliamente usado en agricultura, horticultura y forestería para mejorar la eficacia de los agroquímicos (herbicidas, fungicidas, acaricidas, reguladores de crecimiento y macronutrientes). PEGAMAX es usado como agente dispersante, penetrante y humectante, provee de valores de tensión superficial significativamente menores a otros surfactantes comunes. En consecuencia, cuando se aplican los agroquímicos en mezcla con PEGAMAX la tasa de absorción y el área de cobertura se incrementan y por tanto la eficacia de la aplicación del agroquímico se ve mejorada notoriamente.

TIPO DE APLICACIÓN	DOSIS ml / 200L	DOSIS ml POR MOCHILA DE 20L
Herbicidas	60 - 100 ml	6 - 10
Fungicidas	50 - 100 ml	5 - 10
Insecticidas	50 - 100 ml	5 - 10
Fertilizantes y micronutrientes	40 - 60 ml	4 - 6
Reguladores de crecimiento	40 - 60 ml	4 - 6

POTENTE EN EL CONTROL DE LARVAS

CHLORFENAPYR 24% SC



REG. PQUA N° 414 - SENASA



INSECTIDA DE AMPLIO RANGO DE ACCIÓN.



BUEN MOVIMIENTO TRANSLAMINAR.



INSECTICIDA LARVICIDA DE ALTA PERSISTENCIA EN HOJA.



Genagro

CALIDAD Y EFICIENCIA AGRÍCOLA